

**Инструкция**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ДЕКСА-ГЕНТАМИЦИН**  
**(информация для потребителей)**

**Регистрационное удостоверение: П № 015080/01-2003**

**Лекарственная форма:** капли глазные.

**Состав 1 мл раствора:**

Активные компоненты

Дексаметазона натрия фосфат 1,0 мг

Гентамицина сульфат 5,0 мг (=3,0 мг в пересчете на гентамицин)

Консервант:

Бензалкония хлорид 0,05 мг

Вспомогательные вещества:

Калия гидрофосфат, калия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.

**Описание:** бесцветная прозрачная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** антибиотик-аминогликозид + глюкокортикостероид

**Код АТХ:** D07CB04.

**Показания к применению:**

- инфекции переднего отрезка глаза, вызванные чувствительной к гентамицину микрофлорой (конъюнктивит, кератит, блефарит, ячмень);
- аллергические процессы переднего отрезка глаза, сопровождающиеся бактериальным инфицированием;
- профилактика и лечение воспалительных явлений в послеоперационном периоде (удаление катаракты, антиглаукоматозные операции).

**Противопоказания:**

- кератит, вызванный herpes zoster (древовидный кератит), ветряная оспа и прочие вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы;
- микобактериальные инфекции глаз;
- грибковые заболевания глаз;
- острые гнойные заболевания глаз с поражением роговичного эпителия;
- эпителиопатия роговицы;
- повышенное внутриглазное давление;
- индивидуальная гиперчувствительность к любому из компонентов данного препарата.

Во время лечения глазными каплями Декса-Гентамицин не рекомендуется пользоваться контактными линзами

**Применение при беременности и лактации:**

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения Декса-Гентамицина глазные капли во время беременности, лактации, а также у детей отсутствуют.

Однако препарат может применяться том случае, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.

**Способ применения и дозы:**

Глазные капли Декса-Гентамицин закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-6 раз в день.

Длительность лечения Декса-Гентамицином обычно не превышает 2-3 недель.

Решение о продолжительности лечения основывается на объективных данных, включающих эффективность действия препарата, выраженность симптоматики, возможность возникновения побочных эффектов.

**Побочные эффекты:**

В редких случаях возможны аллергическая реакция и ощущение жжения после закапывания препарата.

Длительное применение препарата может стать причиной возникновения вторичной глаукомы и стероидной катаракты, поэтому при применении препарата более 2-х недель, а также у пациентов, имеющих в анамнезе глаукому, рекомендуется регулярно контролировать внутриглазное давление.

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить пользоваться препаратом и как можно скорее обратиться к офтальмологу.

**Передозировка:**

При местном применении препарата Декса-Гентамицин глазные капли передозировка маловероятна.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При местном применении не описано

**Особые указания:**

Если пациент с разрешения лечащего врача продолжает пользоваться контактными линзами во время лечения препаратом Декса-Гентамицин, то перед закапыванием препарата рекомендуется снять контактные линзы и вновь одеть их не ранее чем через 20 мин после закапывания.

Сразу после применения глазных капель Декса-Гентамицин может возникнуть кратковременное нарушение остроты зрения, приводящее к замедлению психических и физических реакций. Поэтому не рекомендуется применять препарат непосредственно перед работой с механизмами и вождением автотранспорта.

**Форма выпуска:**

По 5 мл в полимерных флаконах-капельницах. Флакон-капельница вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

**Срок хранения:**

3 года. После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 6 недель. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:**

Список Б. Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света, недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек:** по рецепту врача.

**Производитель:**

Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ  
(Ursapharm Arzneimittel GmbH),  
Индустриштрассе, 66129 Саарбрюкен, Германия  
(Industriestraße 35, 66129 Saarbruecken, Germany).

**Представительство в Москве:**

107996, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр.4.  
Тел/факс: (495) 684-34-43, (495) 684-04-96.  
Для корреспонденции: 129110,  
г. Москва, а/я 5.  
e-mail: ursapharm@ursapharm.ru